



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Milloin testaat ja ketä?

LT Eija Hiltunen-Back

Valtakunnalliset Tartuntatautipäivät 16-17.11.2009

Perusohje sukupuolitautilien tutkimiseen terveyskeskuksessa - Windows Internet Explorer

http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/tartuntataudit_ja_epidemiat/perusohje_sukupuolitautilien_tutkimiseen_terveyskeskuksessa/

EPSON Web-To-Page Print Print Preview

Perusohje sukupuolitautilien tutkimiseen terveyskesk...

Rokottaminen Tartuntataudit ja epidemiat KTL terveydenhuollossa Terveyden edistäminen Tapaturmat Ohjeita ja suosituksia Tilastot ja rekisterit Ympäristöterveys Palvelut

Tartuntataudit ja epidemiat

Perusohje sukupuolitautilien tutkimiseen terveyskeskuksessa

Perusohje sukupuolitautilien tutkimiseen terveyskeskuksessa

Sukupuolitautilien tutkimus ja hoidon porrastus pääkaupunkiseudun terveyskeskuksissa

Tämä ohje sukupuolitautilien tutkimukseen ja hoitoon on tarkoitettu alueelliseen käyttöön pääkaupunkiseudulle. Ohjeella tehostetaan myös tartunnanjäilytyksellä tapahtuvaa torjuntaa. Kokemuksen perusteella tullaan laatimaan valtakunnallinen suositus.

Tutkimukset

Tutkittavalta kysytään seuraavat **riskitekijät** diagnostiikan laajuuden arvioimiseksi (ennalta ehkäisevä neuvonta sisältyy haastatteluun):

- suojaamaton seksi (myös suu- ja anaaliseksi) tilapäisen partnerin kanssa
- partnerilla sukupuolitauti tai -epäily
- tartuntamahdollisuus ulkomailla, ulkomaalainen partneri
- miesten välinen seksi
- huumeiden pistoskäyttö

Oireettomat, omasta aloitteestaan tutkimuksiin hakeutuvat

ohjataan ensisijaisesti oman terveysaseman sairaan- tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Mikäli yllämainittuja riskitekijöitä ei ilmene, suositellaan tutkittavaksi

- klamydia anatomisen tartuntapaikan mukaan (U-ChtrNhO, -ChtrNhO)
- hiv (S-HIVAgAb)

Oireiset tai yllämainittuja riskitekijöitä omaavat, seuraavia tutkimuksia harkitaan:

- klamydia ja tippuri anatomisen tartuntapaikan mukaan (U-CtGcNhO, -CtGcNhO)
- jos kliininen tippuriepäily tai U-GcNhO positiivinen, otetaan viljelynäyte (GcVI)

http://www.ktl.fi/portal/16463

Käynnistä KINGSTON (E-) Microsoft PowerPoint - [Perusohje sukupuolitautilien tutkimiseen terveyskeskuksessa/ 16:44

Haastattelu

- **Diagnostiikan laajuuteen vaikuttavat haastattelussa kysyttävät riskitekijät:**
- suojaamaton seksi (myös suu- ja anaaliseksi) tilapäisen partnerin kanssa
- partnerilla sukupuolitauti tai -epäily
- tartuntamahdollisuus ulkomailla, ulkomaalainen partneri
- miesten välinen seksi
- huumeiden pistoskäyttö
- tilaisuus ehkäisevään neuvontaan



Oireettomat

- **tutkimuksiin omasta aloitteesta hakeutuvat** potilaat ohjataan ensisijaisesti oman terveysaseman hoitajan vastaanotolle.
- Suositeltavat tutkimukset, jos ei eo. riskitekijöitä
 - klamydia anatomisen tartuntapaikan mukaan (**U-ChtrNhO, -ChtrNhO**)
 - S-HIV-AgAb**



Jos oireita/ \geq yksi em. riskitekijä

Harkitaan seuraavia tutkimuksia:

- klamydia ja tippuri anatomisen tartuntapaikan mukaan (**U-CtGcNhO, -CtGcNhO**)
- jos on kliininen tippuriepäily tai -GcNhO on positiivinen, otetaan viljelynäyte (**GcVi**) mikrobilääkeherkkyyden määrittämiseksi ennen hoidon aloitusta
- **S-HIV-AgAb, S-TrpaAb, (S-kard+S-TPHA)**



Jos potilaalla todetaan

- joku sukupuolitauti suositellaan testattavaksi myös muut
- huumeiden käyttöä, suositellaan hepatiittitutkimuksia (**S-HbsAg, S-HCV-Ab**)
- C -tai B-hepatiitti, suositellaan HIV- ja kuppanäytettä



Työryhmä

- Petri Ruutu, THL
- Eija Hiltunen-Back, THL, HYKS
- Hannele Kotilainen, Jukka Pellinen, Satu Suhonen, Hannu Penttinen, Helena Tiittanen, Helsingin kaupunki
- Kirsi Valtonen, Päivi Häkkinen, Vantaan kaupunki
- Stiina Zitting, Pirjo-Liisa Suominen Espoon kaupunki
- Annamari Ranki, Pirja Vehviläinen, Matti Ristola, Eeva Ruotsalainen, HYKS
- Lars Ådahl, YTHS
- Antti Ormio, Medivire

